

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-4-72 298389

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 139 d'Avril 1972

7 Avril 1972

page 13

V I G N E

Les conseils du bulletin précédent restent valables en ce qui concerne l'excoriose et les noctuelles.

ARBRES FRUITIERS ET PETITS FRUITS

TAVELURE DU POIRIER — Un nouveau traitement, cette fois étendu à toutes les plantations des régions moyennes et chaudes de la Circonscription, devra être appliqué dès réception.

Dans les plantations d'altitude (régions 1, 2, 28, 48, 65, 72, 91, 93, 109, 112, 113, 114, 127, 144, 149, 150, parties hautes des régions 3, 6, 7, 8, 10, 11, 27, 30, 32, 34, 45, 47, 50, 60, 69, 70, 83, 88, 89, 106, 107, 118, 126, 128, 129, 130, 146, 148, 151) seules les plantations où des attaques sur rameaux ont été constatées l'an dernier ou au cours de la taille devront recevoir un traitement dès réception. Ce traitement sera généralisé après la première période pluvieuse ultérieure.

TAVELURE DU POMMIER — Le premier traitement devra être appliqué dès réception dans la plupart des zones de production, sauf dans les régions énumérées à la rubrique "tavelure du poirier" auxquelles de la même façon, il ne sera étendu qu'après la prochaine période pluvieuse.

BACTERIOSE DU NOYER — Le premier traitement (bouillie cuprique à 200 gr/hl au maximum de cuivre-métal) doit être appliqué au stade d'ouverture des bourgeons, soit sensiblement à la moitié du développement du châton.

HOPLOCAMPE DES POMMES — Les larves de cet insecte percent le fruit d'un trou rond de 2mm de diamètre ou bien laisse une cicatrice circulaire autour de l'oeil. Dans les vergers plus ou moins régulièrement marqués de tels dégâts, appliquer un insecticide (azinphos, carbaryl, diazinon, lindane, malathion, parathion, phosalone, aux doses usuelles) à la chute des pétales.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER — L'évolution de cette maladie étant sensiblement comparable à celle de la tavelure du poirier, les traitements pourront être appliqués dans les mêmes conditions. On utilisera un produit à base de Benomyl (300 gr/hl de m.a.), de Captane (150 gr/hl), de Thirame (200 gr/hl) ou de Mancozèbe (160 gr/hl).

LISTE DES PESTICIDES

La liste des produits phytosanitaires homologués ou en autorisation provisoire de vente pour 1972 vient de sortir des presses.

Elle sera expédiée très prochainement à tous nos abonnés.

L'Ingénieur d'Agronomie chargé
des Avertissements agricoles
P.LATARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
A.PITHIoud

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L.BOUYX

7132